



Behandeling van spataderen door ‘de Muller ingreep’

Inleiding

Omdat u last heeft van spataderen, hebt u samen met uw behandelend arts besloten hier iets aan te laten doen. Bij de polikliniek Dermatologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) worden spataderen niet alleen ‘weggespoten’ maar u kunt ook volgens de “Muller ingreep” behandeld worden.

De behandeling volgens Muller

Bij de Muller ingreep worden kleine (twee millimeter grote) sneetjes in de huid gemaakt boven de spatader. Met kleine haakjes worden de aders er volledig uitgehaald. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De ingreep wordt vooral uitgevoerd bij grotere spataderen. Als er nog kleinere spataderen overblijven, dan kunnen deze op een ander tijdstip worden weggespoten.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats bij de poli Dermatologie van het azM. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie en wordt u door de arts of de verpleegkundige binnengeroepen. In het kleedhokje moet u alle kledingstukken uitdoen zodat de benen onbedekt zijn (broek, kousen, rok). Vervolgens gaat u op een klein bankje staan en tekent de arts de spataderen op het been af met een speciale pen. U neemt plaats op het bed.

Verdoving

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U krijgt daarvoor enkele injecties op de plaatsen waar de spataderen worden verwijderd. Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof of desinfecterende middelen moet u dit van tevoren aan de arts doorgeven. Ook wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u dit melden.

Ingreep

De huid van het been wordt volledig gedesinfecteerd. Het hele operatiegebied wordt afgedekt met steriele doeken. Daarna begint de operatie. In principe is de operatie niet pijnlijk maar u voelt wel dat de arts bezig is aan het been. Als het wel gevoelig is dan moet u dit zeggen zodat wij verdovingsvloeistof kunnen bijspuiten.

Risico’s

De risico’s van een Muller ingreep zijn gering. De meest voorkomende zijn (geringe) bloeduitstorting, nabloeding, wondinfectie en aderontsteking. Meestal verdwijnen deze klachten binnen twee weken. Soms wordt ook tijdelijk en plaatselijk een reactie gezien veroorzaakt door het gebruikte verdovingsmiddel.

Ernstige bijwerkingen worden gelukkig maar zelden gezien en bestaan vooral uit beschadiging van een huidzenuw. Het gevolg van deze beschadiging is verlies van gevoel van de huid ter plaatse. Dit is tijdelijk of blijvend.

Na de ingreep

Na afloop worden de wondjes (twee tot drie millimeter groot) dichtgeplakt met een steriele pleister. Hechten is niet noodzakelijk voor deze kleine wondjes. Om te voorkomen dat er een nabloeding of stolsel optreedt in het operatiegebied, wordt het been ingepakt met een tweetal kousen van de tenen tot aan de knie (of hoger bij spataderen op het bovenbeen).

Eerst een witte kous, die een week lang dag en nacht gedragen wordt. Over de witte kous komt een bruine kous. Deze doet u ’s nachts uit. De tweede week doet u alleen nog overdag de bruine kous aan. Daarna hoeft u geen kous meer te dragen. Als u het toch prettig vindt om de kous nog enkele dagen langer overdag te dragen dan kunt u dat gerust doen. Na twee tot drie weken zijn de wondjes helemaal genezen.

Wij adviseren u, een begeleider mee te nemen. U kunt in principe normaal lopen maar dit kan door de kous soms lastig zijn.

Na de ingreep kunt u alles doen. Wel adviseren wij u niet intensief te gaan sporten.

Telefoonnummers

Als er problemen ontstaan met het been of het verband dan kunt u bellen met:

Polikliniek Dermatologie:

043-387 50 00 (tijdens kantooruren)

Spoed Eisende Hulp (SEH)

043-387 67 00 (`avonds, `nachts en in het weekend)

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt deze stellen aan uw behandelend arts.

Bereikbaarheid

Bezoekadres

P. Debyelaan 25, wijk 29

6202 AZ Maastricht

Postadres

Postbus 5800

6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

I: www.azm.nl

E: InfoPatientenvoorlichting@mumc.nl