



Apexresectie

Behandeling aan de wortelpunt van een tand of kies

Welkom

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM).

U bent verwezen door uw tandarts naar de kaakchirurg voor een behandeling aan de wortelpunt van een tand of kies (een zogenaamde apexresectie). Deze heeft via een zenuwbehandeling (gaatje in uw tand), de ontstekingshaard te verwijderen. Soms lukt het niet om de ontstekingshaard via die weg geheel tot rust te brengen. De hulp van de kaakchirurg wordt dan ingeroepen om het probleem via een gaatje in de kaak op te lossen. Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie van het azM.

Deze informatie is bedoeld u te informeren over de behandeling en daarna.

De Behandeling

Voordat de ingreep plaatsvindt, krijgt u eerst een plaatselijke verdoving.

De behandeling wordt steriel uitgevoerd. Daarom wordt het gebied van de ingreep, inclusief uw ogen, met een groene doek afgedekt. Zo wordt u niet wordt verblind door de operatielamp, maar u kunt wel onder het doek door kijken.

De artsen en assistenten, die u behandelen, hebben een muts op, een maskertje voor de mond en steriele handschoenen aan.

Via een sneetje in het tandvlees wordt een gaatje geboord in het kaakbot. Daarna wordt het onderste puntje van de tandwortel eraf gehaald samen met het ontstekingsproces. Het wortelkanaal wordt direct, vanaf de onderzijde, met vul materiaal afgesloten.

De hele behandeling verloopt absoluut pijnloos. De plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit. Wel blijft u voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte druk en zacht trillen als de boor wordt gebruikt.

De wond wordt gehecht met een materiaal dat in ongeveer twee weken vanzelf oplost. Wordt een ander materiaal gebruikt dan krijgt u een afspraak voor het verwijderen van de hechting.

Na de behandeling

De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Het is verstandig om ongeveer één uur na de behandeling alvast de voorgeschreven pijnstillers in te nemen of, als er niets is voorgeschreven, twee tabletten paracetamol van 500 milligram in te nemen. De pijnstillers werken namelijk veel effectiever als u ze inneemt voordat de pijn opkomt. Zo kunt u gedurende de eerste 48 uur gerust de maximale dosis gebruiken, waarna u het kunt proberen zonder pijnstillers.

Na de behandeling

- De hoeveelheid napijn is van patiënt tot patiënt verschillend en niet goed te voorspellen.
- Er kan een zwelling optreden van de wang. Deze is op z'n hevigst de eerste en tweede dag na de behandeling.
- Geringe temperatuurverhoging onder 38,5 C is normaal.
- Beperking van de mondopening.
- Er kan nog een beetje bloed uit de wond komt is normaal. Dit vermengt zich met uw speeksel waardoor het erger lijkt dan het is.

Wondverzorging

Een zwelling van de wang kan minder worden als u de eerste uren na de behandeling de wang koelt met een ijskompres of coldpack. U doet hier een washandje omheen en steeds enkele minuten tegen de wang houden, en dan er weer enkele minuten af. Roken en het gebruik van alcohol vertraagt de wondgenezing. Wij adviseren u daarom om een vijftal dagen niet te roken en geen alcohol te nuttigen.

Ga de eerste dag niet krachtig spoelen, of zuigen aan de wond, dit vergroot de kans op een nabloeding. Uw tanden kunt u normaal poetsen, behalve het wondgebied.

Complicaties

Nabloedingen komen vrijwel alleen binnen 12 uur na de behandeling voor, en moeten niet verward worden met afvloed van enig roodgekleurd speeksel. Als u een nabloeding vermoedt neemt u contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

- De klachten nemen na drie dagen toe in plaats van af.
- De zwelling blijft, of wordt erger.
- Koorts van 39,0 C of hoger.
- Pijn is niet door pijnstillers te onderdrukken .
- Andere verontrustende bijzonderheden.

Autorijden

Wij adviseren u om na de ingreep niet zelf uw auto te besturen of anders aan het verkeer deel te nemen. Laat u bij voorkeur rijden.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 16.45 uur contact opnemen met:

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Telefoonnummer 043-387 52 00 (b.g.g. 043-387 65 43)

Spoed Eisende Hulp:
Telefoonnummer 043-387 670 0 (’s avonds, ’s nachts en in het weekend)

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl

E: InfoPatiëntenvoorlichting@azm.nl

Uitgave: november 2010